

Сприймай реальність без ВИКРИВЛЕНЬ



ЕРІДОН®

РИСПЕРИДОН

- Доведена ефективність при позитивній та негативній симптоматиці шизофренії ^{1,2}
- Симптоматичне лікування аутичних розладів у дітей віком від 5 років ³
- Доведена біоеквівалентність оригінальному рисперидону ⁴



Швейцарські стандарти якості

JA-ERID-IMI-092019-002

Скорочена інструкція для медичного застосування препарату ЕРІДОН

Діюча речовина. Рисперидон. Лікарська форма. 1 таблетка містить рисперидону 2 мг або 4 мг; 1 мл розчину містить 1 мг рисперидону. **Фармакотерапевтична група.** Антипсихотичні засоби. **Фармакологічні властивості.** Рисперидон — селективний антагоніст 5-HT₂-серотонінергічних та D₂-дофамінергічних рецепторів; він блокує також α₁-адренергічні та меншою мірою — гістамінові H₁- і α₂-адренергічні рецептори, не виявляючи впливу на холінергічні рецептори; не спричиняє значного пригнічення моторної активності та порівняно з класичними нейролептиками меншою мірою індукує каталепсію. Збалансований центральний антагонізм до серотоніну і дофаміну зменшує схильність до екстрапірамідних побічних ефектів та розширює терапевтичний вплив препарату з охопленням негативних та афективних симптомів шизофренії. **Показання.** Лікування шизофренії та інших психічних розладів, у тому числі підтримуюча терапія, у пацієнтів, у яких спостерігалася відповідь на терапію, з метою запобігання рецидиву хвороби; лікування маніакальних епізодів при біполярних розладах (допоміжна терапія у комбінації з нормотиміками як початкове лікування або як монотерапія на період тривалістю до 12 тижнів); короточасне лікування вираженої агресії або тяжких психічних симптомів у пацієнтів з деменцією при існуванні загрози заподіяння шкоди собі чи іншим; симптоматичне лікування зухвалих опозиційних розладів або інших розладів соціальної поведінки у дітей, підлітків та дорослих з розумовим розвитком нижче середнього або розумовою відсталістю, які мають прояви деструктивної поведінки (імпульсивність, аутоагресія); симптоматичне лікування аутичних розладів у дітей віком від 5 років, у яких симптоми варіюють від гіперактивності до роздратованості (включаючи агресію, завдання собі тілесних ушкоджень, тривожність та патологічні циклічні дії). **Протипоказання.** Гіперчутливість до активного компонента або до будь-якої допоміжної речовини у складі препарату. Деменція та симптоми хвороби Паркінсона (ригідність, брадикардія та паркінсонічні порушення постави). Деменція та підозра на деменцію з тільцями Леві (окрім симптомів деменції з найменше два з таких симптомів: паркінсонізм, візуальні галюцинації, хиткість ходи). **Побічні реакції.** Паркінсонізм, головний біль, акатизія, запаморочення, тремор, дистонія, сонливість, седація, летаргія, дискінезія; безсоння; тривож, хвилювання, розлади сну, депресія; нечіткість зору; тахікардія, артеріальна гіпертензія; диспное, носова кровотеча, кашель, закладеність носа, фаринголарингний біль; пневмонія, грип, бронхіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів; блювання, діарея, запор, нудота, біль у животі, диспепсія, сухість у роті, абдомінальний дискомфорт, зубний біль, підвищення апетиту, зниження апетиту; енурез; висипання, еритема; артралгія, біль у спині, біль у кінцівках; премоція, втоми, парасиферичний набряк; астенія; гіпертрофічний набряк; збільшення маси тіла тощо. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Р. П. МОЗ України:** № UA/17620/01/01, UA/17620/01/02. Наказ МОЗ України від 30.08.2019 № 1 925 № UA/17620/01/01, UA/17620/01/02. **Виробник:** ТОВ «Фарма Старт», Україна, 03124, м. Київ, бульвар І.Львів, 8; ТОВ «Фарма Старт» входить до групи компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкції для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

1. IckedJan M., Hux M., Remington G.J. The Canadian experience with risperidone for the treatment of schizophrenia: an overview. Journal of Psychiatry and Neuroscience 1998;23:229-39. 2. Song F. Risperidone in the treatment of schizophrenia: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Psychopharmacol 1997;11(1): 65-71. 3. Інструкція для медичного застосування препарату ЕРІДОН, Р. П. МОЗ України: № UA/17620/01/01, UA/17620/01/02. Наказ МОЗ України від 30.08.2019 № 1 925 № UA/17620/01/01, UA/17620/01/02. 4. Bioequivalence Study Number - P1CU04001, Cln report May, 2005.

ТОВ АСІНО УКРАЇНА | бульвар В. Гавела, 8 | Київ | 03124 | Україна
Компанія Acino Group, Швейцарія | www.acino.ua