


Перейди на СВІТЛИЙ бік життя



АРИПРАЗОЛ

АРИПІПРАЗОЛ

- Препарат вибору для пацієнтів із шизофренією при несприятливому метаболічному профілі¹
- Покращує соціальне функціонування¹⁻⁴
- Доведена біоеквівалентність оригінальному арипіпразолу⁵



Швейцарські стандарти якості

UA-ARIP-IMI-022019-008

Скорочена інструкція для медичного застосування препарату АРИПРАЗОЛ

Діяча речовина: арипразол; 1 таблетка містить арипразолу 10 мг або 15 мг (у перерахунок на 100% суху речовину арипразолу). **Лікарська форма.** Таблетки. **Фармакотерапевтична група.** Психолептики. Антипсихотичні засоби. Інші нейролептики. Код АТХ N05A X12. **Фармакологічні властивості.** Терапевтична дія арипразолу в лікуванні шизофренії та біполярного розладу 1 типу ґрунтується на сполученні часткового агонізму відносно рецепторів дофаміну D2 і серотоніну 5-HT_{1A}, а також антагонізмізму відносно рецепторів серотоніну 5-HT_{2A}. Відомо, що арипразол виявляє антагоністичні властивості на тваринних моделях дофамінергічної гіперактивності і агоністичні властивості на тваринних моделях дофамінергічної гіпоактивності. Арипразол має високу афіність зв'язування із обома вірними рецепторами дофаміну D2 і D3, рецепторами серотоніну 5-HT_{1A} і 5-HT_{2A}, а також помірно афіність відносно рецепторів дофаміну D4, серотоніну 5-HT_{2C} і 5-HT₇, адренергічних рецепторів альфа-1 і рецепторів гістаміну H1. Арипразол також має помірну афіність відносно серотонінових рецепторів і не має помітної афіності відносно мускаринових рецепторів. Взаємодія з іншими рецепторами, крім підтипів дофаміну і серотоніну, може пояснювати деякі інші клінічні ефекти арипразолу. **Показання.** Препарат Арипразол® показаний для лікування шизофренії у дорослих. Арипразол® показаний також для лікування помірних і тяжких маніакальних епізодів при біполярному розладі 1 типу, а також для запобігання новим маніакальним епізодам у дорослих, які раніше перенесли маніакальні епізоди, та які відповідали на лікування арипразолом. **Протипоказання.** Гіперчутливість до арипразолу або до будь-якого іншого компонента препарату. **Побічні реакції.** Збудження, безсоння, нудота, екстрапірамідні порушення, акатизія, тремор, запаморочення, сонливість, седативний ефект, головний біль, розмитість поля зору, диспепсія, блювотка, нудота, запор, надмірне слиновиділення; втома (розділ скорочено, для детальної інформації див. інструкцію для медичного застосування). **Категорія відпуску.** За рецептом. **Р. П. МОЗ України:** № UA15765/01/01, №UA15765/01/02. Виробник: ТОВ «Фарма Стар», Україна, 03124, м. Київ, бульвар В. Гавела, 8. ТОВ «Фарма Стар» входить до групи компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкції для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

1. Hasan A. et al. (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 2: Update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects. The World Journal of Biological Psychiatry, 2013; 14: 2-44. 2. Matsuda Y. et al. Effects of risperidone and aripiprazole on neurocognitive rehabilitation for schizophrenia. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2014; 68: 425-431. 3. Wang J. et al. Cognitive effects of atypical antipsychotic drugs in first-episode drug-naïve schizophrenic patients. Neural Regen Res 2013;8:277-86. 4. Bervoets C. et al. Effect of aripiprazole on verbal memory and fluency in schizophrenic patients: results from the ESCAPE study. CNS Drugs. 2012 Nov;26(11):975-82. 5. Bioequivalence Study Number 464/14, Clin. Report, Jan. 2016.